

500g

鎮痒・収斂・消炎剤

亜鉛華・サリチル酸軟膏 (ラッサパスタ)

Zinc And Salicylic Acid Ointment (Lassar's Paste)

製造販売元

 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

亜鉛華・サリチル酸軟膏(ラッサパスタ) 500g

2009年9月作成(第1版)	
日本標準商品分類番号	872649
承認番号	14100AZZ06932
薬価収載	未収載
販売開始	1967年1月

貯法：室温保存

使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

注意：本製品の容器材質はポリエチレン製樹脂のため金属製のヘラを使用した場合、容器と接触する角度、強さにより容器が削られることがあるので注意すること。

●組成・性状

1.組成

100g中 酸化亜鉛 25g
サリチル酸 2g

及び添加物としてパレイシヨデンブ、白色ワセリン 含有。

2.性状

白色の軟膏で、においはほとんどない。

●効能・効果

炎症期及び落屑期の湿疹、白癬、そう痒症、乾癬、尋常性癬瘡

●用法・用量

本品の適量をそのまま、または、ガーゼ等にのばして貼用する。

●使用上の注意

1.重要な基本的注意

患部が化膿しているなど湿潤、び爛が著しい場合には、あらかじめ適切な処置を行った後使用すること。

2.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

(1)長期・大量使用：

長期または体表の1/5を越える広範囲使用により、アシドーシス、意識混濁、聴覚障害等があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止すること。
また、糖尿病、末梢血管障害のある患者に使用した場合、急性炎症、潰瘍化が起こることが報告されている。

(2)過敏症：

過敏症状があらわれることがあるので、そのような症状があらわれた場合には、使用を中止すること。特に、年少者に対して使用する場合には注意すること。

3.妊婦、産婦、授乳婦への使用

妊婦または妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。[サリチル酸の経口投与による動物実験で催奇形作用が報告されている。]

4.小児等への使用

低出生体重児、新生児、乳児、幼児または小児では、副作用が発現しやすいので慎重に使用すること。

5.適用上の注意

使用部位：眼には使用しないこと。

使用時：

(1)長期間使用しても症状の改善が認められない場合には、改めて診断し適切な治療を行うことが望ましい。

(2)広範囲の病巣に使用した場合は、副作用があらわれやすいので注意して使用すること。



キャップ：PP
ボトル：PE

製造番号

使用期限

GS1-RSS

(01)14987211100114

4 987211 100117

JAN