

〔※2005年12月改訂(第3版)〕
2000年7月改訂

日本標準商品分類番号 872649	
承認番号	(60AM)4074
薬価収載	1985年8月
販売開始	1985年8月
再評価結果	1979年2月

〈貯 法〉
気密容器に保存

【禁 忌】(次の部位には使用しないこと)
重度又は広範囲の熱傷

【組成・性状】
本剤1000g中、酸化亜鉛100gを含有する白色～淡黄色の軟膏である。
添加物としてサラシミツロウ、ダイズ油、ジブチルヒドロキシトルエンを含有する。

【効能・効果】

- 下記皮膚疾患の取れん・消炎・保護・緩和な防腐
外傷、熱傷、凍傷、湿疹、皮膚炎、肛門瘻痒症、
白癬、面皰、癬、よう
- その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面

〈YP-111M〉

D8

亜鉛華(10%)単軟膏.YI

Zinc Oxide Simple Ointment

500g
創傷保護取れん剤

販売 岩城製薬株式会社 ※製造販売 山田製薬株式会社
東京都中央区日本橋本町4-8-2 東京都墨田区東駒形1-14-1

【用法・用量】

通常、症状に応じ1日1～数回、患部に塗擦又は貼付する。

【使用上の注意】

1. 副作用

	頻度不明
過敏症	過敏症状があらわれた場合には使用を中止すること。
皮膚	発疹、刺激感等の症状があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

眼には使用しないこと。

【薬効薬理】

外皮用創傷保護、取れん作用

使用期限

製造番号

