

【处方应付】写滑石粉、滑石、飞滑石均付滑石粉。

【贮藏】贮干燥容器内，置干燥处，防尘。

## 阳 起 石

Yangqishi

### TREMOLITUM

【来源】本品为硅酸盐类角闪石族矿物透闪石 Tremolite 及其异种透闪石石棉。主含碱式硅酸镁钙 $[\text{Ca}_2\text{Mg}_5(\text{Si}_4\text{O}_{11})_2 \cdot (\text{OH})_2]$ 。

【采收与加工】采挖后，除去泥沙、杂石。

【炮制】阳起石 取原药材，除去杂质，洗净，干燥，打成碎块。

煨阳起石 取净阳起石碎块，照煨法（附录 I），煨至红透，取出，放冷，碾碎。

酒阳起石 取净阳起石碎块，照煨淬法（附录 I），用黄酒淬至药物酥脆，取出，干燥，碾碎。

每 100kg 阳起石，用黄酒 20kg。

【成品性状】阳起石 为不规则碎块状，大小不一。白色、浅灰白色或淡绿白色，有时具浅黄棕色条纹或花纹，具丝绸样光泽。体重，质较硬脆，有的略疏松。断面不整齐，纵面呈纤维状或细柱状。气无，味淡。

煨阳起石 为不规则颗粒或纤维状粉末。青灰色，质酥脆，无光泽。

酒阳起石 为灰白色或灰黄色碎粒或粉末。质松，无光泽，略有酒气。

【检查】碳酸盐 取阳起石粉末约 0.5g，滴加稀盐酸 3~4 滴，不得发生气泡，或不得加热后发生大气泡。

【性味与归经】咸，微温。归肾经。

【功能与主治】温肾壮阳。用于肾阳虚衰，腰膝冷痹，男子阳痿遗精，女子宫冷不孕。

【用法与用量】4.5~9g，或入丸、散。

【处方应付】写阳起石付阳起石，写煨阳起石付煨阳起石，写酒阳起石付酒阳起石。

【注意事项】阴虚火旺者禁服，不宜久服。

【贮藏】贮干燥容器内，置干燥处，防尘。

## 阴 起 石

Yinqishi

### ACTINOLITUM

【来源】本品为硅酸盐类角闪石族矿物阳起石岩。主含含水硅酸铁镁钙 $[\text{Ca}(\text{Mg} \cdot \text{Fe})_5(\text{Si}_4\text{O}_{11})_2 \cdot (\text{OH})_2]$ 。

【采收与加工】采挖后，除去泥沙、杂石。

【炮制】阴起石 取原药材，除去杂质，打成碎块。

煨阴起石 取净阴起石碎块，照煨淬法（附录 I），用黄酒淬至药物酥脆，取出，干燥，

碾碎。

每100kg阴起石,用黄酒20kg。

**【成品性状】**阴起石 为不规则块状、扁条状或柱状。表面不平滑,浅灰绿色、绿色至暗绿色,具丝绸或玻璃样光泽。体重,质较硬脆,易断碎,断面呈纤维状;有的较疏松,易捻成纤维状碎粉。气无,味淡。

**煨阴起石** 为不规则碎粒或粉末,青灰色至灰黄色,质松,无光泽,略有酒气。

**【性味与归经】**咸,微温。归肾经。

**【功能与主治】**补肾壮阳。用于阳痿,遗精,早泄,宫寒不孕,腰膝酸软,带下白淫。

**【用法与用量】**5~12g,或入丸、散。

**【处方应付】**写煨阴起石、阴起石均付煨阴起石。

**【贮藏】**贮干燥容器内,置干燥处,防尘。

## 青 礞 石

Qingmengshi

### LAPIS CHLORITI

**【来源】**本品为变质岩类黑云母片岩 Biotite Schist、绿泥石化云母碳酸盐片岩 Mica Carbonate Schist by Chloritization。主含钾、镁、铁、铝的硅酸盐  $[K(Mg, Fe)_2(AlSi_3O_{10})(OH, F)_2]$ 。

**【采收与加工】**采挖后,除去泥沙、杂石。

**【炮制】青礞石** 取原药材,除去杂质,打成碎块或碾成粉末。

**煨青礞石** 取净青礞石碎块,照明煨法(附录I),煨至红透,取出,放凉,碾成细粉。

**【成品性状】青礞石** 为不规则的碎块、碎粒或粉末。黑云母片岩 碎块呈褐黑色或绿黑色,具玻璃样光泽。质软,易碎,断面呈较明显的层片状。碎粉主为黑色或绿黑色鳞片(黑云母),有似星点样闪光。气微,味淡。绿泥石化云母碳酸盐片岩 碎块呈灰色或绿灰色,夹有银色或淡黄色鳞片,具珍珠样光泽。质松,易碎。碎粉为灰绿色鳞片(绿泥石化云母片)和类白色颗粒(主为碳酸盐),片状者具星点样闪光。遇稀盐酸产生气泡,加热后泡沸反应激烈。气微,味淡。

**煨青礞石** 为细粉状,青黄绿色,质软,略有光泽。

**【性味与归经】**甘、咸,平。归肺、心、肝经。

**【功能与主治】**坠痰下气,平肝定惊。用于顽痰咳喘,气逆喘咳,癫痫发狂,烦躁胸闷,惊风抽搐。

**【用法与用量】**3~6g,多人丸、散。

**【处方应付】**写青礞石付青礞石,写煨青礞石付煨青礞石。

**【贮藏】**贮干燥容器内,防尘。