

碾碎。

每100kg阴起石,用黄酒20kg。

【成品性状】阴起石 为不规则块状、扁条状或柱状。表面不平滑,浅灰绿色、绿色至暗绿色,具丝绸或玻璃样光泽。体重,质较硬脆,易断碎,断面呈纤维状;有的较疏松,易捻成纤维状碎粉。气无,味淡。

煨阴起石 为不规则碎粒或粉末,青灰色至灰黄色,质松,无光泽,略有酒气。

【性味与归经】咸,微温。归肾经。

【功能与主治】补肾壮阳。用于阳痿,遗精,早泄,宫寒不孕,腰膝酸软,带下白淫。

【用法与用量】5~12g,或入丸、散。

【处方应付】写煨阴起石、阴起石均付煨阴起石。

【贮藏】贮干燥容器内,置干燥处,防尘。

青 礞 石

Qingmengshi

LAPIS CHLORITI

【来源】本品为变质岩类黑云母片岩 Biotite Schist、绿泥石化云母碳酸盐片岩 Mica Carbonate Schist by Chloritization。主含钾、镁、铁、铝的硅酸盐 $[K(Mg, Fe)_2(AlSi_3O_{10})(OH, F)_2]$ 。

【采收与加工】采挖后,除去泥沙、杂石。

【炮制】青礞石 取原药材,除去杂质,打成碎块或碾成粉末。

煨青礞石 取净青礞石碎块,照明煨法(附录I),煨至红透,取出,放凉,碾成细粉。

【成品性状】青礞石 为不规则的碎块、碎粒或粉末。黑云母片岩 碎块呈褐黑色或绿黑色,具玻璃样光泽。质软,易碎,断面呈较明显的层片状。碎粉主为黑色或绿黑色鳞片(黑云母),有似星点样闪光。气微,味淡。绿泥石化云母碳酸盐片岩 碎块呈灰色或绿灰色,夹有银色或淡黄色鳞片,具珍珠样光泽。质松,易碎。碎粉为灰绿色鳞片(绿泥石化云母片)和类白色颗粒(主为碳酸盐),片状者具星点样闪光。遇稀盐酸产生气泡,加热后泡沸反应激烈。气微,味淡。

煨青礞石 为细粉状,青黄绿色,质软,略有光泽。

【性味与归经】甘、咸,平。归肺、心、肝经。

【功能与主治】坠痰下气,平肝定惊。用于顽痰咳喘,气逆喘咳,癫痫发狂,烦躁胸闷,惊风抽搐。

【用法与用量】3~6g,多人丸、散。

【处方应付】写青礞石付青礞石,写煨青礞石付煨青礞石。

【贮藏】贮干燥容器内,防尘。

金 礞 石

Jinmengshi

LAPIS MICAE AUREUS

【来源】本品为变质岩类云母片岩的风化物蛭石片岩 Vermiculite Schist 或水黑云母片岩 Hydrobiotite Schist。主含含钾、镁、铁、铝的硅酸盐 $[K(Mg,Fe)_2(AlSi_5O_{10})(OH,F)_2]$ 。

【采收与加工】采挖后,除去泥沙、杂质。

【炮制】金礞石 取原药材,除去杂质,打成碎块。

煨金礞石 取净金礞石碎块,照明煨法(附录 I),煨至红透,取出,放凉,碾碎。

【成品性状】金礞石 为不规则的碎块或碎片。棕黄色或黄褐色,带有金黄色或银白色光泽。质脆,用手捻之,易碎成金黄色闪光小片。具滑腻感。气微,味淡。

煨金礞石 为不规则碎粒或粉末状,金黄色,光泽较生品强。质酥。气微,味淡。

【性味与归经】甘、咸,平。归肺、心、肝经。

【功能与主治】坠痰下气,平肝镇惊。用于顽痰胶结,咳逆喘急,癫痫发狂,烦躁胸闷,惊风抽筋。

【用法与用量】3~6g,多人丸散用。

【处方应付】写金礞石付金礞石,写煨金礞石付煨金礞石。

【贮藏】贮干燥容器内,置干燥处,防尘。

石 膏

Shigao

GYPSUM FIBROSUM

【来源】本品为硫酸盐类石膏族矿物石膏 Gypsum。主含含水硫酸钙 $(CaSO_4 \cdot 2H_2O)$ 。

【采收与加工】采挖后,除去泥沙、杂质。

【炮制】生石膏 取原药材,除去杂质,洗净,干燥,打成碎块或粗粉。

煨石膏 取净石膏块或粗粉,照明煨法(附录 I),煨至红透、酥脆时,取出,放凉,碾碎。

【成品性状】生石膏 为不规则块状或粉末。白色、灰色或淡黄色,有的半透明。体重,质软,纵断面呈纤维状或板状,并有绢丝样光泽。无臭,味淡。

煨石膏 为不规则酥松碎块或粉白色的粉末,表面透出微红色的光泽,不透明。体较轻,质软,易碎,捏之成粉。无臭,味淡。

【检查】重金属 取本品 16g,加冰醋酸 4ml 与水 96ml,煮沸 10 分钟,放冷,加水至原体积,滤过。取滤液 25ml,依法检查(附录 XXII 第一法),含重金属不得超过百万分之十。

砷盐 取生石膏 1g,加盐酸 5ml,加水至 23ml,加热使溶解,放冷,依法检查(附录 XXIII),含砷量不得超过百万分之二。

【含量测定】取生石膏细粉约 0.2g、煨石膏细粉约 0.15g,精密称定,置锥形瓶中,加稀盐酸 10ml,加热使溶解,加水 100ml 与甲基红指示液 1 滴,滴加氢氧化钾试液至溶液显浅黄